<https://doi.org/10.33878/2073-7556-2020-19-3-37-48>

ПРЕДИКТОРЫ КОЛЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СВЕРХТЯЖЕЛЫМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ

Ачкасов С.И., Шапина М.В., Веселов В.В., Варданын А.В., Мингазов А.Ф.,
Пономаренко А.А.

ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих» Минздрава России
(ул. Саяма Адилы, д. 2, Москва, 123423, Россия)

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: выявить предикторы колэктомии у пациентов со «сверхтяжелой» атакой язвенного колита.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ: проанализированы результаты лечения 74 случаев тяжелой атаки язвенного колита в 2017 году. Пациенты разделены на группы хирургического – 54 и консервативного лечения – 20. Исследовались такие предикторы, как уровень сывороточного альбумина, С – реактивного белка, гемоглобина, эндоскопическая картина и клинические данные.

РЕЗУЛЬТАТЫ: не выявлено различий по полу, возрасту, длительности заболевания в группах. Средние значения уровня альбумина и гемоглобина были статистически значимо ниже (28 г/л и 96 г/л) в группе колэктомии. Эндоскопическая картина «обширных, сливающихся между собой язвенных дефектов» статистически значимо чаще встречалась у оперированных больных – 78%, по сравнению с 5% в группе консервативного лечения, $p < 0.0001$. Риск колэктомии при наличии эндоскопической картины составил 85%, а при сочетании с уровнем альбумина менее 31 г/л и гемоглобином менее 107 г/л риск повышался до 100%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эндоскопическая картина «обширных, сливающихся язвенных дефектов» в сочетании с уровнем альбумина менее 31 г/л и гемоглобина менее 107 г/л являются предикторами колэктомии с высокой прогностической ценностью.

[Ключевые слова: язвенный колит, колэктомия, предикторы колэктомии]

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ: Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Для цитирования: Ачкасов С.И., Шапина М.В., Веселов В.В., Варданын А.В., Мингазов А.Ф., Пономаренко А.А. Предикторы колэктомии у пациентов со сверхтяжелым язвенным колитом. *Колопроктология*. 2020; т. 19, № 3, с. 37-48. <https://doi.org/10.33878/2073-7556-2020-19-3-37-48>

PREDICTORS OF COLECTOMY IN PATIENTS WITH «EXTREMELY SEVERE» ULCERATIVE COLITIS

Sergey I. Achkasov, Marina V. Shapina, Victor V. Veselov, Armen V. Vardanyan,
Airat F. Mingazov, Alexey A. Ponomarenko

Ryzhikh National Medical Research Center of Coloproctology (Salyama Adilya
str., 2, Moscow, 123423, Russia)

AIM: to identify predictors of colectomy in patients with «extremely severe» ulcerative colitis.

PATIENTS AND METHODS: seventy-four patients with severe ulcerative colitis in 2017 were included in the study. The patients were divided into the groups of colectomy (54 pts) and conservative treatment (20 pts).

The predictors such as serum albumin, C-reactive protein, hemoglobin, endoscopic picture, and clinical data were analyzed.

RESULTS: the groups were homogeneous by gender, age and duration of the disease. Mean albumin and hemoglobin levels were significantly lower (28 g/l and 96 g/l) in the colectomy group.

The endoscopic picture of «extensive ulcer defects merging among themselves» was significantly more common in the operated patients – 78%, compared with 5% in the conservative treatment group ($p < 0.0001$). The risk of colectomy in the presence of an endoscopic picture was 85%, and when combined with an albumin level of less than 31 g/l and hemoglobin of less than 107 g/l, the risk increased to 100%.

CONCLUSION: the endoscopic picture of «extensive, merging ulcerative defects» in combination with an albumin level of less than 31 g/l and hemoglobin less than 107 g/l are predictors of colectomy with high predictive value.

[Key words: ulcerative colitis, colectomy, predictors of colectomy]

CONFLICTS OF INTERESTS: The authors declare no conflicts of interest.

For citation: Achkasov S.I., Shapina M.V., Veselov V.V., Vardanyan A.V., Mingazov A.F., Ponomarenko A.A. Predictors of colectomy in patients with «extremely severe» ulcerative colitis. *Koloproktologiya*. 2020; v. 19, no. 3, pp. 37-48. <https://doi.org/10.33878/2073-7556-2020-19-3-37-48>

Дата поступления – 06.04.2020
Received – 06.04.2020

После доработки – 15.05.2020
Revised – 15.05.2020

Принято к публикации – 20.08.2020
Accepted for publication – 20.08.2020

ВВЕДЕНИЕ

Среди всех форм язвенного колита (ЯК) тяжелая атака наблюдается у 25% пациентов [1]. Из них хирургическому лечению подвергаются 40% больных, при этом, по данным ряда авторов, летальность в этой группе пациентов достигает 6,3% [2,3]. Лечение в таких случаях начинают с медикаментозной терапии и только при её неэффективности прибегают к колэктомии [4]. Стоит отметить, что несвоевременно выполненное хирургическое вмешательство приводит к тяжелым метаболическим нарушениям, инфекционным осложнениям в послеоперационном периоде, повышает риск летального исхода [5,6]. Выделение группы больных высокого риска, которым показано раннее хирургическое лечение, позволило бы избежать ненужной лекарственной терапии и выполнить колэктомию с минимальной частотой осложнений, чтобы избежать летального исхода [6]. Однако в настоящий момент отсутствуют четкие критерии, отвечающие на вопрос, какой именно категории пациентов необходимо раннее хирургическое вмешательство. Общепринятая классификация Truelove-Witts учитывает лишь тяжесть течения заболевания, и колэктомия рассматривается только при возникновении жизнеугрожающих осложнений [4]. Несмотря на то, что в российских клинических рекомендациях выделен сверхтяжелый ЯК, лечебная тактика в отношении этой группы больных соответствует стандартам лечения тяжелой атаки и не предусматривает показаний к выполнению ранней колэктомии [4]. По нашему мнению, необходимо разработать критерии, которые позволили бы выделить группу

пациентов высокого риска неблагоприятных исходов для определения показаний к хирургическому вмешательству в ранние сроки.

Таким образом, целью данного исследования явилось определение предикторов колэктомии у пациентов со сверхтяжелой атакой ЯК.

ПАЦИЕНТЫ И МЕТОДЫ

Нами проведен ретроспективный анализ 74 пациентов с тяжелой атакой ЯК, которые находились на лечении в клинике в 2017 году (Рис. 1). У всех пациентов констатирована тяжелая атака язвенного колита, основываясь на критерии Truelove-Witts. Всем пациентам проводилось обследование и консервативное лечение, согласно действующим национальным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению ЯК, среди них 54/74 (73%) были подвергнуты хирургическому вмешательству.

Хирургическое лечение выполнялось при неэффективности консервативной терапии. Под неэффективностью медикаментозного лечения понималось развитие гормональной резистентности или зависимости при невозможности назначения биологической терапии, вследствие высокого риска развития жизнеугрожающих осложнений; а также потеря ответа на фоне проводимой терапии препаратами второй линии лекарственного лечения. Данным пациентам выполнялась колэктомия либо колпроктэктомия в зависимости от тяжести поражения прямой кишки и планируемого восстановления кишечной непрерывности.

Рисунок 1. Характеристика госпитализированных пациентов
Figure 1. Characteristics of hospitalized patients

Таблица 1. Характеристика пациентов с тяжелой атакой ЯК**Table 1.** Characteristics of patients with severe UC

Факторы	Колэктомия, n=54	Без колэктомии, n=20	P
Возраст, медиана (min-max)	36 (18-75)	32 (23-66)	0,33
Пол, абс., %			
Мужчины	28 (52%)	12 (60%)	0,6
Женщины	26 (48%)	8 (40%)	
Длительность заболевания, медиана, мес. (min-max)	12 (0-200)	31 (1-200)	0,14
Острое течение заболевания, абс., %	16 (29%)	5 (25%)	0,77
Биологическая терапия, абс., %	10 (18%)	10 (50%)	0,001
Альбумин, среднее, г/л ($\pm$ SD)	28 ($\pm$ 5,2)	34 ($\pm$ 4,8)	0,0002
С-реактивный белок, медиана, мг/л (min-max)	67 (1-200)	35 (1-120)	0,01
Гемоглобин, среднее, г/л ($\pm$ SD)	96 ($\pm$ 19)	118 ($\pm$ 18)	<0,0001
Обширные язвенные дефекты при колоноскопии, абс., %	42 (78%)	1 (5%)	<0,0001

Таблица 2. Результаты однофакторного и многофакторного анализов**Table 2.** The results of single-factor and multi-factor analyses

Фактор	Однофакторный анализ		Многофакторный анализ	
	ОШ (95% ДИ)	p	ОШ (95% ДИ)	p
Альбумин	0,8 (0,71-0,91)	0,001	0,67 (0,48-0,9)	0,017
С-реактивный белок	1,01 (0,99-1,02)	0,053		
Гемоглобин	0,94 (0,91-0,97)	0,0005	0,88 (0,79-1,0)	0,018
Эндоскопическая картина	83,6 (9,9-699,8)	0,000045	2926 (171-499021,5)	0,0023

Как предикторы колэктомии, были исследованы следующие факторы: уровень сывороточного альбумина, гемоглобина, С – реактивного белка и характер эндоскопической картины в виде наличия обширных язвенных дефектов, а также клинические данные. Уровень гемоглобина и сывороточного альбумина оценивался на основании данных лабораторных исследований независимо от факта переливания крови и её компонентов. Стоит заметить, что под обширными язвенными дефектами понималась эндоскопическая картина, при которой мы наблюдали выраженные воспалительные изменения слизистой оболочки толстой кишки с образованием обширных, сливающихся между собой, глубоких, вплоть до мышечного слоя, язвенных дефектов с «островками» уцелевшей слизистой оболочки или вовсе ее отсутствие.

Необходимо отдельно упомянуть, что колоноскопия (сигмоскопия) и лабораторное обследование проводилось всем пациентам при поступлении в клинику. Далее переоценка лабораторных показателей осуществлялась на 3-и и 7-е сутки гормональной терапии, а также внепланово при ухудшении состояния больных, в том числе, при необходимости, выполнялась повторная сигмоскопия без подготовки. В анализе предикторов колэктомии, главным образом, использованы данные обследований, полученные на момент констатации неэффективности консервативной терапии и установки показаний к операции, независимо от сроков проводимой терапии.

Статистический анализ.

При нормальном распределении признака сравнение производили непарным t – критерием, при ненормальном распределении – критерием Манна-Уитни. Были использованы методы логистической регрессии и ROC – анализа для построения предсказательной модели. Статистический анализ производился с использованием программного обеспечения «Statistica 13.3» и «RStatistica».

РЕЗУЛЬТАТЫ

По полу, возрасту, длительности анамнеза заболевания, количеству больных с дебютом заболевания группы были сопоставимы (Табл. 1). Биологическая терапия в анамнезе статистически значимо чаще встречалась у пациентов в группе больных без колэк-

Рисунок 2. ROC – анализ уровней альбумина и гемоглобина**Figure 2.** ROC analysis of albumin and hemoglobin levels

Эндоскопия (да/нет)
Альбумин<31, гемоглобин<107

Эндоскопия (да/нет)
Альбумин>31,
гемоглобин>107

Риск колэктомии (%)

Рисунок 3. Номограмма вероятности колэктомии у больных тяжелым ЯК
Figure 3. Nomogram of the probability of colectomy in patients with severe UC

томии, $p=0,001$. Среди пациентов, которым выполнялась колэктомия, средние значения уровней альбумина и гемоглобина были статистически значимо ниже в сравнении с группой без колэктомии ($p=0,0002$ и $p<0,0001$, соответственно).

Проведен дополнительный анализ по данным лабораторным показателям и было выявлено, что в группе колэктомии значения альбумина в пределах нормы встречались у 7/54 (13%), что статистически значимо ниже, чем в группе без колэктомии – 10/20 (50%), $p=0,0016$. Так же, как и уровень гемоглобина в пределах референсных значений наблюдался лишь у 8/54 (15%) больных в группе колэктомии и у 8/20 (40%) – в группе без колэктомии, $p=0,01$.

Медиана уровня С – реактивного белка была вдвое выше в группе колэктомии, $p=0,01$. При анализе эндоскопической картины: в группе колэктомии у 42/54 (78%) наблюдались обширные язвенные дефекты, в то время как в группе без колэктомии – лишь у 1/20 (5%), $p<0,0001$.

При однофакторном анализе среди всех пациентов с тяжелой атакой язвенного колита было выявлено, что уровень альбумина, наличие обширных язвенных дефектов и уровень гемоглобина связаны с выполнением колэктомии в течение госпитализации. В ходе многофакторного анализа оказалось, что все вышеуказанные факторы являются независимыми предикторами колэктомии (Табл. 2).

Проведен ROC – анализ (Рис. 2), в ходе которого определены пороговые значения, связанные с колэктомией: для альбумина <31 г/л (чувствительность – 76%, специфичность – 80%, $p=0,0003$) и для гемоглобина <107 г/л (чувствительность – 76%, специфичность – 70%, $p=0,0002$).

На основании полученных бинарных данных предикторов проведена логистическая регрессия, в результате которой оказалось, что все факторы статистически значимо оказывают влияние на риск колэктомии.

Построена номограмма, предсказывающая вероятность колэктомии у пациентов с тяжелой атакой язвенного колита (Рис. 3). На основании построенной модели выявлено, что при наличии у пациента обширных язвенных дефектов при колоноскопии и значения альбумина, гемоглобина выше установленных пороговых величин, риск колэктомии составил 85%. Если же эндоскопическая картина сочеталась с любым из приведенных лабораторных показателей ниже пороговых величин, риск колэктомии возрастал до 100%.

Данная логистическая модель обладает статистически значимо высокой предсказательной ценностью ($AUC=0,93$, $p=0,006$) (Рис. 4).

ОБСУЖДЕНИЕ

В течение длительного времени в литературе неоднократно предпринимались попытки выделить группу больных высокого риска колэктомии при тяжелом

Рисунок 4. ROC – кривая логистической модели ($AUC=0,93$)
Figure 4. ROC – curve of the logistics model ($AUC=0.93$)

ЯК. Однако до настоящего времени по-прежнему отсутствуют единые критерии стратификации данной категории пациентов. Согласно американским национальным рекомендациям, выделяется «фульминантный» колит – представляет собой острое течение ЯК, тяжесть которого не укладывается в традиционную классификацию Truelove-Witts. «Фульминантный» колит характеризуется метаболическими нарушениями и прогрессирующим ухудшением состояния, требующим интенсивной терапии. Согласно последнему пересмотру американских клинических рекомендаций, подобное течение ЯК является показанием к выполнению ранней колэктомии в течение 24 часов после госпитализации [7]. Европейской организацией по изучению язвенного колита и болезни Крона выделяется «острый тяжелый» колит, однако лечебная тактика при этом соответствует терапии тяжелой атаки, а к хирургическому лечению рекомендуется прибегать при возникновении угрозы развития осложнений [8].

В России, согласно последней редакции клинических рекомендаций, выделяется особая категория больных со сверхтяжелым ЯК. Эта форма тяжелого ЯК идентична по своей сути «фульминантному» колиту, однако лечебная тактика по отношению к подобному роду пациентам осталась прежней и подразумевает гормональную терапию в течение 7 дней с оценкой ответа и субъективным решением врача – гастроэнтеролога о целесообразности назначения терапии 2-й линии [4]. Тем не менее, во всех случаях, когда выделяются группы высокого риска колэктомии, тяжесть течения ЯК у них учитывается лишь на основании классификации Truelove-Witts. «Новые» объективные критерии, на основании которых возможен пересмотр действующих клинических рекомендаций, до настоящего времени отсутствуют.

Как было продемонстрировано в проведенном анализе, одним из таких критериев является эндоскопическая картина в виде «обширных, глубоких, сливающихся между собой язвенных дефектов с образованием «островков» слизистой оболочки». Вероятность колэктомии при её наличии составила 85%. Однако, стоит заметить, что наряду с эндоскопической картиной возможно использование лабораторных показателей, таких как альбумин и гемоглобин. Как показал анализ, при сочетании лабораторных показателей ниже установленных пороговых величин с такой эндоскопической картиной риск колэктомии повышался до 100%.

Схожие данные получены в исследовании, проведенном Xie T. и соавт. При значении шкалы тяжести эндоскопической картины UCEIS > 7 баллов риск колэктомии превышал 80% (ОШ=4.37 (95% ДИ 1.17-9.05), $p < 0,001$) [9]. Объективно, этого бывает недостаточно для принятия решения о колэктомии и, с целью повы-

шения диагностической ценности эндоскопического критерия в реальной клинической практике, целесообразно дополнение его лабораторными показателями. Повышение прогностической ценности при сочетании предикторов колэктомии подтверждено в исследовании Dalal R.S. и соавт., включившем в анализ результаты исходов лечения 440 пациентов с тяжелым ЯК. Сочетание выраженной эндоскопической и клинической картины с уровнем альбумина менее 28 г/л достоверно коррелировало с последующей колэктомией (AUC=0,93 (95% ДИ: 0,92-0,95), $p < 0,01$) [10].

Несвоевременное хирургическое лечение повышает частоту послеоперационных осложнений, что было продемонстрировано при анализе национальной базы больных ЯК в США за 2017 год. Проанализированы результаты лечения 2650 пациентов, перенесших колэктомию по поводу тяжелого ЯК. Частота послеоперационных осложнений составила 44,5% в группе ранней колэктомии, выполненной в течение 24 часов, что оказалось статистически значимо ниже по сравнению с 51,6% в группе поздней операции, проведенной после 24 часов от момента поступления, $p = 0,003$. Авторы также показали, что выполнение оперативного вмешательства в поздние сроки сопряжено со значимым повышением финансовых затрат. Так, послеоперационный койко-день составил 8 дней – в группе ранней и 16 дней – в группе поздней операции, $p < 0,001$. Стоимость лечения при этом оказалась статистически значимо ниже в группе ранней операции: \$20,948 и \$33,666, соответственно ($p < 0,001$) [6].

По нашему мнению, изначально выраженные воспалительные изменения в толстой кишке, низкий нутритивный статус, сопровождающийся тяжелыми метаболическими нарушениями у этой особой группы пациентов, в ходе медикаментозной терапии неизбежно приводят к неблагоприятным исходам. Как показали результаты исследования Geoffrey C. и соавт., гипоальбуминемия < 30 г/л сопровождается неблагоприятными исходами у больных тяжелым ЯК. Послеоперационная летальность у этих больных статистически значимо выше в группе пациентов с альбумином менее 30 г/л, по сравнению с группой нормального уровня альбумина: 5,6% и 0,1%, соответственно, $p < 0,01$. Послеоперационные осложнения также регистрируются статистически значимо чаще в группе тяжелой гипоальбуминемии: 28% и 15%, соответственно, $p < 0,01$, (ОШ=2,08; 95% ДИ: 1.75-2.48). У пациентов этой группы отмечено статистически значимое повышение риска глубокой инфекции передней брюшной стенки, внутрибрюшной инфекции, пневмонии, сепсиса и септического шока, а также у них оказался выше риск развития кардиологических, неврологических и др. осложнений [5].

В свете всего вышеизложенного, стоит отметить, что выявленные в ходе проведенного нами исследования предикторы колэктомии продемонстрировали высокую прогностическую ценность в отношении необходимости хирургического лечения у больных тяжелым ЯК. Эти же предикторы являются объективными критериями сверхтяжелой атаки у пациентов с тяжелым ЯК, которым, в том числе, показано раннее хирургическое вмешательство.

Несомненно, для подтверждения полученных результатов необходимо проведение многоцентрового проспективного исследования с большим числом пациентов, что позволит повысить уровень их доказательности.

ВЫВОДЫ

В результате проведенного исследования продемонстрировано, что наличие обширных, сливающихся язвенных дефектов, выявляемых при колоноскопии у больных тяжелым ЯК в сочетании с уровнем сывороточного альбумина менее 31 г/л, гемоглобина менее 107 г/л являются предикторами колэктомии с высокой прогностической ценностью. Проведенный анализ имеет ограничения вследствие ретроспектив-

ности данных и малого числа больных. Полученные результаты использованы при планировании дизайна Российского многоцентрового обсервационного исследования «Предикторы колэктомии у пациентов со сверхтяжелой атакой язвенного колита», которое на данный момент зарегистрировано, и начат набор больных ([clinical.trials.gov: NCT0394793](https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT0394793)).

УЧАСТИЕ АВТОРОВ:

Концепция и дизайн исследования: Мингазов А.Ф., Варданян А.В.

Сбор и обработка материалов: Мингазов А.Ф., Шапина М.В.

Статистическая обработка: Мингазов А.Ф., Пономаренко А.А.

Написание текста: Мингазов А.Ф., Пономаренко А.А.

Редактирование: Ачкасов С.И., Веселов В.В.

THE PARTICIPATION OF THE AUTHORS:

Concept and design of the study: Mingazov A.F., Vardanyan A.V.

Collection and processing of the material: Mingazov A.F., Shapina M.V.

Statistical processing: Mingazov A.F., Ponomarenko A.A.

Writing of the text: Mingazov A.F., Ponomarenko A.A.

Editing: Achkasov S.I., Veselov V.V.

ЛИТЕРАТУРА

1. Burisch J, Barros L, et al. Natural disease course of ulcerative colitis during the first five years of follow-up in a European population-based inception cohort – an Epi-IBD study. *Journal of Crohn's and colitis*. 2018. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjy154.
2. Williams JG, Alam MF, et al. Infliximab versus ciclosporin for steroid-resistant acute severe ulcerative colitis (CONSTRUCT): a mixed methods, open-label, pragmatic randomised trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2016;1(1):15-24. DOI: 10.1016/S2468-1253(16)30003-6.
3. Merino O, Vera M, et al. Post-operative morbidity and mortality of a cohort of steroid refractory acute severe ulcerative colitis: Nationwide multicenter study of the GETECCU ENEIDA Registry. *The American Journal of Gastroenterology*. 2018;1-8. DOI: 10.1038/s41395-018-0057-0.
4. Ивашкин В.Т., Шелыгин Ю.А., и соавт. Проект клинических рекомендаций по диагностике и лечению язвенного колита. *Колопроктология*. 2019; № 4, т. 18, с. 7-36. DOI: 10.33878/2073-7556-2019-18-4-7-36.
5. Nguyen GC, Du L, et al. Hypoalbuminaemia and Postoperative Outcomes in Inflammatory Bowel Disease: the NSQIP Surgical Cohort.

- Journal of Crohn's and colitis*. 2019;1433-8. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjz083.
6. Leeds IL, Truta B, et al. Early Surgical Intervention for Acute Ulcerative Colitis Is Associated with Improved Postoperative Outcomes. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2017;10(21):1675-1682. DOI: 10.1007/s11605-017-3538-3.
7. Holubar SD, Soop M, et al. Medical Management of Chronic Ulcerative Colitis. *The ASCRS Manual of Colon and Rectal Surgery*. 2019;601-616. DOI: 10.1007/978-3-030-01165-9.
8. Harbord M, Eliakim R, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. *Journal of Crohn's and Colitis*. 2017;12(11):1512-1512. doi:10.1093/ecco-jcc/jjx009.
9. Xie T, Zhang T, et al. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS) versus Mayo Endoscopic Score (MES) in guiding the need for colectomy in patients with acute severe colitis. *Gastroenterology Report*. 2018;1(6):38-44. DOI: 10.1093/gastro/gox016.
10. Dalal RS, Osterman L, et al. A User-Friendly Prediction Tool to Identify Colectomy Risk in Patients With Ulcerative Colitis. *Inflammatory Bowel Diseases*. 2019;25(9):1550-1558. DOI: 10.1093/ibd/izz014.

REFERENCES

1. Burisch J, Barros L, et al. Natural disease course of ulcerative colitis during the first five years of follow-up in a European population-based inception cohort – an Epi-IBD study. *Journal of Crohn's and colitis*. 2018. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjy154.
2. Williams JG, Alam MF, et al. Infliximab versus ciclosporin for steroid-resistant acute severe ulcerative colitis (CONSTRUCT): a

- mixed methods, open-label, pragmatic randomised trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol*. 2016;1(1):15-24. DOI: 10.1016/S2468-1253(16)30003-6.
3. Merino O, Vera M, et al. Post-operative morbidity and mortality of a cohort of steroid refractory acute severe ulcerative colitis: Nationwide multicenter study of the GETECCU ENEIDA Registry.

- The American Journal of Gastroenterology*. 2018;1-8. DOI: 10.1038/s41395-018-0057-0.
4. Ivashkin V.T., Shelygin Yu.A. et al. Draft clinical guidelines for the diagnosis and treatment of ulcerative colitis. *Koloproktologia*. 2019; v. 18, no. 4, pp. 7-36. DOI: 10.33878/2073-7556-2019-18-4-7-36. (in Russ.).
5. Nguyen GC, Du L, et al. Hypoalbuminaemia and Postoperative Outcomes in Inflammatory Bowel Disease: the NSQIP Surgical Cohort. *Journal of Crohn's and colitis*. 2019;1433-8. DOI: 10.1093/ecco-jcc/jjz083.
6. Leeds IL, Truta B, et al. Early Surgical Intervention for Acute Ulcerative Colitis Is Associated with Improved Postoperative Outcomes. *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2017;10(21):1675-1682. DOI: 10.1007/s11605-017-3538-3.
7. Holubar SD, Soop M, et al. Medical Management of Chronic Ulcerative Colitis. *The ASCRS Manual of Colon and Rectal Surgery*. 2019;601-616. DOI: 10.1007/978-3-030-01165-9.
8. Harbord M, Eliakim R, et al. Third European Evidence-based Consensus on Diagnosis and Management of Ulcerative Colitis. Part 2: Current Management. *Journal of Crohn's and Colitis*. 2017;12(11):1512-1512. doi:10.1093/ecco-jcc/jjx009.
9. Xie T, Zhang T, et al. Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity (UCEIS) versus Mayo Endoscopic Score (MES) in guiding the need for colectomy in patients with acute severe colitis. *Gastroenterology Report*. 2018;1(6):38-44. DOI: 10.1093/gastro/gox016.
10. Dalal RS, Osterman L, et al. A User-Friendly Prediction Tool to Identify Colectomy Risk in Patients With Ulcerative Colitis. *Inflammatory Bowel Diseases*. 2019;25(9):1550-1558. DOI: 10.1093/ibd/izz014.