

<https://doi.org/10.33878/2073-7556-2022-21-3-19>



Комментарии редколлегии к статье

«Неэффективность тазовых тонкокишечных резервуаров у больных язвенным колитом», авторы: Ачкасов С.И., Куликов А.Э., Мингазов А.Ф., Варданян А.В., Алешин Д.В., Суровегин Е.С., Шахматов Д.Г., Сушков О.И.

Редакция журнала считает необходимым обратить внимание читателей на опубликованные данные, обобщающие опыт формирования тазовых тонкокишечных резервуаров при язвенном колите.

Под «неэффективностью» резервуара (НР) авторы имеют ввиду такие осложнения, при которых под угрозой находится смысл выполненного вмешательства и нет возможности восстановить анальную дефекацию.

В работе продемонстрирован опыт лечения пациентов с НР [30/140 (21,4%)]. Несмотря на крайне сложную когорту пациентов, в большинстве случаев — 22/30 (73,3%), удалось сохранить резервуарную конструкцию, тогда как удалению резервуара было подвергнуто лишь 8/30 (26,6%) пациентов.

Крайне важно подчеркнуть, что благодаря кумуляции подобных пациентов в одном учреждении, в 9/30 (30%) случаях удалось выполнить трансанальное удаление оставшейся части прямой кишки с мобилизацией тонкокишечного резервуара и формирование резервуаро-анального анастомоза, с последующим восстановлением анальной дефекации. Данная методика «спасения» резервуара более нигде в стране не выполняется.

Таким образом, НР — очень грозное состояние, которое несомненно ухудшает качество жизни больных и может привести, в итоге, к потере резервуара и введению постоянной илеостомы. Лечение подобных больных должно проходить только в узкоспециализированных учреждениях, имеющих опыт выполнения операции с формированием тонкокишечного резервуара.